

Клинический протокол скорой медицинской помощи при вегетативных кризах.

Нозологическая форма	Вегетативные кризы
Код по МКБ-10	G 90
Фаза	Острое состояние
Стадия	Любая
Вид медицинской помощи	Скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи	Вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи	Экстренная

Критерии отнесения пациента к модели	Пароксизмальные эмоционально-аффективные состояния с полисистемными вегетативными симптомами: – изменение ритма сердца (брадикардия, тахикардия, аритмия), кардиалгия, изменения АД, дыхательные расстройства: чувство нехватки воздуха, одышка, затруднение дыхания, волны жара и холода , желудочно – кишечные расстройства, страх и паника, чувство кома в горле.
Классификация	Симпатико-адреналовый криз (неприятные ощущения в области грудной клетки, тахикардия, подъем АД, озноб, чувство страха, тревоги, сухость и бледность кожных покровов, приступ завершается полиурией с выделением светлой мочи). Вагоинсулярный криз (головокружение, тошнота, брадикардия, снижение АД, покраснение лица, гипергидроз, желудочно-кишечные дискинезии). Вегетативный криз смешанного типа
Формулировка развернутого диагноза	Симпато- адреналовый криз. Вегето-сосудистая дистония.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

Наименование медицинской услуги
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров витальных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т °С, сатурация).
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров витальных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т °С, сатурация).

2. Инструментальные методы исследования.

Регистрация электрокардиограммы.	Для всех бригад.
Передача дистанционной	Для фельдшерских бригад при наличии технической возможности и трудностях

ЭКГ	дифф.диагностики
Описание и интерпретация электрокардиографических данных	Для всех бригад.
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	Для всех бригад
Пульсоксиметрия.	Для всех бригад

3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.

Наименование медицинской услуги	Примечание
Катетеризация кубитальной и других периферических вен.	Для всех бригад.
Внутривенное введение лекарственных препаратов.	Для всех бригад.
ИВЛ (аппаратная)	Для всех бригад.

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних разовых доз.

Производные бензодиазепина	Диазепам	10-20 мг	При наличии эмоционально-аффективных симптомах панической атаки
Селективные бета адреноблокаторы	Метопролол	15 мг	При повышенном АД, тахи – кардии, тахиаритмии, без проявлений ОСН/ХСН По 5 мг в/в (за 1–2 мин.) , каждые 3–5 минут до достижения эффекта под контролем АД, ЧСС. Высшая разовая доза 15 мг.

5. Критерии эффективности.

- Стабилизация АД в пределах рабочих цифр пациента;
- Купирование вегетативной и эмоционально–аффективной симптоматики;
- Отсутствие осложнений.

6. Тактический алгоритм.

- Госпитализация больного в профильный стационар при впервые возникших (пешком) и не купируемых кризах на носилках;